

CURRICULUM VITAE

del Dr. MARCELLO CELLINA

Il Dr. Marcello Cellina , nato l'11 ottobre 1904 si é laureato nel 1928 (12 luglio) con il massimo dei punti e la lode nella R.Università di Pavia.

Nei sei anni di Università fu alunno dell'Almo Collegio Borromeo, dove fu ammesso in seguito a concorso e dove rimase poi per tutta la durata del corso universitario. Durante gli ultimi quattro anni di Università fu allievo interno nell'Istituto Camillo Golgi , diretto dal Prof. A. Perroncito , col quale discusse il tema di laurea, " Sulla pressione osmotica del sangue durante la dieta acolorurata " (vedi lavoro N° 1).

Nel quinto e sesto corso frequentò pure , come allievo interno , la Clinica Medica della R. Università , dove ebbe modo di addestrarsi all'esame del malato ed altresì nelle indagini di Laboratorio. (Vedi certificato del Prof.A.Ferrata).

Laureatosi nel luglio del 1928 continuò a frequentare l'Istituto di Patologia Generale fino all'ottobre dello stesso anno, portando a termine le ricerche intraprese, che gli erano in parte servite come tema di laurea e che furono successivamente pubblicate (lavori N. 1 e 2) , ed é solo per la immatura fine del Prof. Perroncito che dell'attività dimostrata come studente e come medico interno non si può presentare alcuna attestazione diretta.

Passò poi come interno nell'Istituto di Anatomia Patologica della R. Università di Milano, dove vinse, in concorso interno, nel gennaio 1929, uno dei posti della Rockefeller Foundation, istituiti nell'Istituto stesso, posto che tenne fino al febbraio 1930, avendo agio, sulla scorta dell'ampio materiale cadaverico, di addestrarsi alla diagnostica macro-e microscopica, e prendendo attenta parte nell'attività scientifica e didattica dell'Istituto.

Avendo ottenuto, come ex alunno del Collegio Borromeo, una borsa di perfezionamento a Vienna, vi si recò dal febbraio al luglio 1930 frequentando in questo periodo di tempo l'Istituto Anatomico Patologico del Krankenhauses der Stadt Wien, diretto dal Prof. J. Erdheim; dove si occupò di ricerche sull'aorta (vedi lavoro N. 8 e certificato del Prof. Erdheim).

Ritornato nell'Istituto di Anatomia Patologica di Milano vi fu nominato assistente nel dicembre 1930 e fu poi riconfermato per l'anno accademico 1931 - 32. Oltre ad occuparsi di ricerche di cui si dirà più avanti, il Dr. Cellina si è attivamente interessato dell'attività scientifica e didattica dell'Istituto, ha seguito la discussione epicritica ed ha preso diretta visione di circa 4000 autopsie, avendo così occasione di acquistare cognizioni nei campi più svariati della patologia e di osservare reperti assai rari. In questo periodo di tempo ha tenuto, il Dr. Cellina, un corso di esercitazioni pratiche di istologia patologica

per gli studenti del IV° e V° corso di medicina. Del lodevole servizio prestato fa fede il certificato del Prof. Pepere.

Nell'anno 1931 vinse una borsa della " Fondazione L. Mangiagalli „ (vedi certificato del Magnifico Rettore della R.Università).

Il Dr. Cellina é iscritto al P.N.F. dal 1 gennaio 1926 (tessera N.I04.235 A.X.) e fa parte dell'Associazione Fascista della Scuola , Sezione Assistenti Universitari.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

del Dottor MARCELLO CELLINA

- 1° La pressione osmotica del sangue durante la dieta acolorurata - (Arch. di Scienze Biologiche, Vol.XV, N°I-1930)
- 2° Delle variazioni del CL e del CO2 nel sangue durante la dieta acolorurata (Arch.di Scienze Biologiche-Vol.XIV N° 4 - 1930)
- ④ 3° Epiploite tubercolare (Tuberculoma dell'epiploon) (Arch. Ital. di Anatomia e istologia patologica N°1-1930)
- 4° Contributo alla conoscenza delle cisti dell'uraco (Arch.Ital. di Anatomia e istologia patologica-N.2 -1930)
- ⑦ 5° Rilievi statistici e considerazioni sui tumori maligni osservati nel biennio 1928 - 1929 - Comunicazione tenuta alla seduta 14 dicembre 1930 della Sezione Lomb.della Lega Ital. per la lotta contro il cancro - (Boll. della Lega Ital. per la lotta contro il Cancro , N° 1 - 1931)
- ⑧ 6° Della tubercolosi pedunculata del peritoneo (Morbo perlaceo) nell'uomo (Pensiero Medico , N° 3 - 1931)
- ④ 7° Rilievi statistici e sistematici sui tumori maligni osservati nel ^{biennio} 1928-1929)(Arch.Ital. di Anatomia e istologia patologica , N° 1 - 1931)

8° Medionecrosis disseminata aortae (Virchow's Archiv,
Vol.280 , Fasc. 1°)

9° Di una grossa ciste metaemorragica da erosione tuber-
colare dell'a. diaframmatica inferiore in corso di m. di
Addison - (Arch. Ital. di Anatomia e istologia patologica
N. 2-1931)

10° Contributo alla conoscenza del sarcoma primitivo
dello stomaco - (Arch. Ital. di Anatomia e istolog.patolo-
gica N° 3 - 1931)

11° Sul comportamento della sostanza mucoside dell'aorta
negli stati infettivi acuti e cronici (Cuore e circolazione-
anno XV nuova serie → 1931)

12° Di un grosso lipoma pendulo dell'epicardio. Contributo
alla conoscenza dei tumori benigni del pericardio. -
(Giornale di Clinica Medica - fasc. XVII - 1931)

13° Sulle rotture " cosiddette spontanee " dell'aorta ed in
particolare su di una rara alterazione della tunica media
del vaso - (Arch. Ital. di Anatomia e istologia patologica
N. 5 - 1931)

14° L'arteria polmonare nell'infezione reumatica (Le basi
anatomiche del rumore di Graham Steel) - (Cuore e Circola-
zione , anno XV (nuova serie 1931)

15° I paragangliomi carotidei - In collaborazione con il
Dr. Nava) - (Annali ital. di Chirurgia - 1932 - fasc.V°)

16° Il reticolo endotelioma (istiocitoma) primitivo del
fegato(Arch. Ital.di Anat.e Istol. Patol.-N.3 -1932)

17° I tumori mesenchimali primitivi del fegato.
(Arch. Ital.di Anat.e Istol.Patol.-N.4 -1932)

18° Su non comuni esiti di processi pleuritici.
(Giornale di Clin. Medica- N.9-1932)

19° Contributo anatomo clinico alla conoscenza della
sifilide polmonare ~~x~~ congenita tardiva.(In collaborazione
con il dr.Macchi.)-(La Pediatria- 1932)

20° La ricerca della bacillemia tubercolare con la metodica
del Löwenstein.(Bollett.dell'Istit.Sier.Milan.-N.8-1932)

-o-o-o-o-o-o-o-

20^a) Neoformazione di dotti biliari con cisti nella periepatite
cronica (pathologica 1932).

Descrizione e discussione di due esemplari con neoformazione
abbondante di dotti biliari e con qualche cisti nello spessore
di glissoniana. La presenza dei dotti biliari si fa dipendere
dalla periepatite: le cisti si sarebbero prodotte con il meca-
nismo della trazione esercitata da connettivo fibroso sulla parete
dei dotti biliari.

Figure 1